

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 18-3-74 726259

**BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES**

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION DES PAYS DE LA LOIRE ANGERS

Tél. 88.56.15
88.06.15

**ABONNEMENT
ANNUEL**

(MAINE & LOIRE, LOIRE-ATLANTIQUE, SARTHE, VENDÉE, MAYENNE)

Régisseur de recettes de la D.D.A. - Protection des Végétaux - Cité Administrative rue Dupetit-Thouars - 49043 ANGERS CEDEX

C. C. P. Nantes 86-04-02

30 frs

BULLETIN N° 4 de MARS 1974 -

TOUS DEPARTEMENTS..... p. 1

ARBRES FRUITIERS

TAVELURE DU POIRIER -

Les premiers périthèces sont arrivés à maturité dans la Vallée de la Loire. Des projections d'ascospores pourront donc avoir lieu lors des prochaines pluies et des contaminations seront possibles sur les variétés ayant atteint ou dépassé le stade sensible C3 D (bourgeon éclaté et apparition du sommet des inflorescences).

Dans les vergers des départements de la Loire-Atlantique (sauf le Nord), du Maine et Loire, de la Vendée, du Sud de la Sarthe et de la Mayenne, il y a donc lieu d'effectuer un premier traitement sur toutes les variétés ayant atteint ou dépassé le stade C3 D. Sur les variétés à débourrement plus tardif, ce traitement devra être exécuté au fur et à mesure que ce stade sera atteint.

Dans les vergers du Nord des départements de la Loire Atlantique, de la Sarthe et de la Mayenne, les périthèces sont sur le point d'arriver à maturité. Il est cependant encore trop tôt pour intervenir. La Station donnera très prochainement de nouvelles informations.

TAVELURE DU POMMIER -

Quelques rares périthèces sont sur le point d'arriver à maturité, mais les variétés n'ont pas encore atteint le stade sensible C3 D. Il est donc encore trop tôt pour intervenir.

OIDIUM DU POMMIER -

Les premiers germes de cette affection sont déjà formés dans les boutons floraux contaminés. Cette maladie risque de se développer précocement. Il est cependant encore trop tôt pour intervenir.

Le Chef de la Circonscription Phytosanitaire des "PAYS DE LA LOIRE"

J. DIXMERAS

Les Ingénieurs chargés des Avertissements Agricoles:

R. GEOFFRION - J. BOUCHET

TIRAGE DU 14 MARS 1974

Pesticides homologués ou en autorisation provisoire de vente au 1^{er} Janvier 1974

utilisables contre les ennemis des cultures mentionnés ci-dessous

LISTES ÉTABLIES PAR LE SERVICE CENTRAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

LES PESTICIDES HOMOLOGUES sont suivis de leur dose d'emploi exprimée, sauf indications contraires en grammes de matière active par hectolitre d'eau. En ce qui concerne les poudrages, les doses sont indiquées, en grammes de matière active par hectare, pour les cultures annuelles seulement.

LES PESTICIDES EN AUTORISATION PROVISOIRE DE VENTE sont précédés d'un astérisque.

A. - ARBRES FRUITIERS

1. — RAVAGEURS ANIMAUX

Anthronome du pommier :

lindane : 12 g
méthoxychlore : 100 g

Anthronome du poirier :

lindane : 12 g
méthoxychlore : 100 g

Carpocapse des pommes et des poires :

azinphos éthyl et méthyl : 40 g
carbaryl : 75 g
* dialifor : 75 g
diazinon : 30 g
diéthion : 100 g
diméthoate : 50 g
fénitrothion : 50 g
fenthion : 50 g
* forméthane
formothion : 50 g
malathion : 75 g
méthoxychlore : 125 g
méthidathion : 30 g
parathion éthyl : 25 g
parathion méthyl : 30 g
phosalone : 60 g
phosmet : 50 g
phosphamidon : 40 g
* tétrachlorvinphos

Tordeuse orientale du pêcher :

azinphos éthyl et méthyl : 40 g
carbaryl : 120 g
* dichlorvos
fénitrothion : 50 g
méthidathion : 40 g
mévinphos : 50 g
parathion éthyl et méthyl : 25 g
phosalone : 60 g

Pucerons :

* acéphate
azinphos éthyl et méthyl : 40 g
bromophos : 50 g
carbophénathion : 45 g
* dialifor : 75 g
diazinon : 25 g
diéthion : 100 g
diméthoate : 30 g

* dioxacarbe (puceron vert du pêcher)

endosulfan : 60 g
fénitrothion : 50 g
fenthion : 75 g
formothion : 40 g
isolane : 10 g
lindane : 30 g
malathion : 75 g

* métamidophos

méthidathion : 30 g
méthomyl : 50 g
mévinphos : 50 g

* monocrotophos (puceron vert du pommier)

naled : 100 g
nichlorfos : 50 g
nicotine : 150 g
ométhoate : 60 g
oxydéméton méthyl : 25 g
parathion éthyl : 20 g
parathion méthyl : 30 g
phosalone : 60 g
phosphamidon : 20 g
pirimicarbe : 37,5 g
prothoate : 30 g
* thiométon
vamidothion : 50 g

Acaricidants (1) :

esters phosphoriques de contact

azinphos éthyl et méthyl : 40 g
carbophénathion : 45 g
dialifor : 75 g
diazinon : 25 g
diéthion : 100 g
malathion : 75 g
méthidathion : 40 g
parathion éthyl : 25 g
parathion méthyl : 30 g
phenkapton : 30 g
phosalone : 60 g
prothoate : 30 g

esters phosphoriques systémiques

diméthoate : 30 g
formothion : 40 g
ométhoate : 60 g
oxydéméton méthyl : 25 g
vamidothion : 50 g

acaricides spécifiques

sulfones et sulfonates

chlorbenside : 50 g
chlorofénizon : 50 g
fénizon : 50 g
tétradifon : 16 g
tétrasul : 40 g

composés halogénés

* bromopropylate
dicofol : 50 g

dérivé du benzène

binapacryl : 50 g

quinoxaline

chinométhionate : 12,5 g
thioquinox : 37,5 g

formamidine

chlorphénamidine : 50 g

divers

* benzomate
chlorfénéthol + chlorfensulfide : 37,5 g + 37,5 g
* chlorphénamidine + forméthane
dioxathion + fénizon : 25 g + 50 g
* fénazaflor
* hydroxyde de tricyclohexylétain

Mouche méditerranéenne des fruits :

diéthylidiphényldichloréthane : 175 g
diméthoate : 30 g
fenthion : 50 g
formothion : 37,5 g
malathion : 100 g
méthoxychlore : 250 g
trichlorfon : 100 g

Mouche de la cerise :

diazinon : 30 g
diméthoate : 30 g
fenthion : 50 g
formothion : 50 g
* malathion
oléoparathions : 20 g

Mouche de l'olive :

diazinon : 30 g
diméthoate : 30 g
* fenthion
formothion : 40 g
phosphamidon : 30 g

2. — MALADIES

Tavelures :

- bouillies bordelaise et bourguignonne, oxychlorure de cuivre, sulfate basique de cuivre, oxyde cuivreux : 250 g de cuivre métal (dose maximum)
bouillie sulfocalcique : dose homologuée pour chaque spécialité commerciale
- | | |
|---|----------------------------|
| * benomyl | manèbe : 160 g |
| captafol : 100 g | * méthylthiophanate |
| captane : 150 g | oxyquinoléate |
| carbatène : 200 g | de cuivre : 80 g |
| * carbendazim | propinèbe : 200 g |
| dichlone : 50 g | soufres micronisés : 600 g |
| dithianon : 50 g | de soufre (dose max.) |
| doguadine : 70 g | thirame : 200 g |
| folpel : 100 g | zinèbe : 200 g |
| mancozèbe : 160 g | zirame : 180 g |
| association de zinèbe et de cuivre, association de zirame et de cuivre : doses homologuées pour chaque spécialité commerciale | |

Oïdiums :

- * benomyl
binapacryl : 50 g
bouillie sulfocalcique : dose homologuée pour chaque spécialité commerciale
chinométhionate : 7,5 g
dinocap : 25 g
drazoxolon : 40 g
* méthylthiophanate
soufres fluents en poudrage
soufres dispersés : 600 g de soufre pur (dose maximum)
soufres micronisés : 600 g de soufre pur (dose maximum)

Cloque du pêcher :

- bouillies bordelaise et bourguignonne, oxychlorure de cuivre, oxyde cuivreux, sulfate basique de cuivre : 500 g de cuivre métal
captafol : 120 g
captane : 250 g
ferbame : 175 g
thirame : 175 g
zirame : 175 g
association de zirame et de cuivre : dose homologuée pour chaque spécialité commerciale

3. — TRAITEMENT D'HIVER DES ARBRES FRUITIERS

- colorants nitrés : 600 g
dinoterbe : 600 g
huiles anthracéniques : 5 l d'huile réelle
* huile d'anthracène + fluénétol + huile minérale
huiles de pétrole : 2,5 l à 3 l d'huile réelle
huiles jaunes : 1,5 l à 2 l d'huile réelle + 100 à 150 g de DNO
oléomalathion : 1 l d'huile réelle + 300 g de malathion
oléoparathions : 1,25 l d'huile réelle + 45 g de parathion
association d'huiles anthracéniques et de colorants nitrés, association d'huiles anthracéniques et d'huiles de pétrole, association d'huiles anthracéniques, d'huiles de pétrole et de colorants nitrés : doses homologuées pour chaque spécialité commerciale

Remarque : Sur les arbres fruitiers à noyau, les doses d'emploi des huiles anthracéniques et des huiles de pétrole doivent être réduites de moitié

B. - VIGNE

1. — RAVAGEURS ANIMAUX

Tordeuses de la grappe :

- | | |
|--------------------------------|---|
| * acéphate | |
| aziphos éthyl et méthyl : 40 g | |
| bromophos : 50 g | |
| carbaryl : 120 g | |
| carbaryl : en poudrage | |
| dialifor : 75 g | |
| diazinon : 25 g | |
| diazinon : en poudrage | |
| * dichlorvos | |
| fénitrothion : 50 g | |
| malathion : 75 g | |
| malathion : en poudrage | |
| méthomyl : 37,5 g | |
| méthidathion : 30 g | |
| | mévinphos : 50 g |
| | parathion éthyl : 20 g |
| | parathion méthyl : 30 g |
| | parathion éthyl et méthyl : en poudrage |
| | phosalone : 60 g |
| | phosalone : en poudrage |
| | * tétrachlorvinphos |

Acarions (1) :

esters phosphoriques de contact

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| aziphos éthyl et méthyl : 40 g | |
| carbophénouthion : 30 g | |
| * dialifor | parathion méthyl : 30 g |
| diazinon : 25 g | phenkapton : 20 g |
| diéthion : 75 g | phosalone : 60 g |
| malathion : 75 g | phosalone : en poudrage |
| méthidathion : 40 g | prothoate : 30 g |
| parathion éthyl : 25 g | |

esters phosphoriques systémiques

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| diméthoate : 30 g | oxydéméton méthyl : 25 g |
| formothion : 40 g | vamidothion : 50 g |
| * monocrotophos | |

acaricides spécifiques

sulfones et sulfonates

- | | |
|----------------------|---------------------|
| chlorbenside : 50 g | |
| chlorofénizon : 50 g | * tétradifon : 16 g |
| fénizon : 50 g | tétrasil |

composés halogénés

- | | |
|------------------|-----------------------|
| * bromopropylate | |
| dicofol : 50 g | dicofol : en poudrage |

quinoxaline

- thioquinox : 37,5 g

formamidine

- * chlorphénamidine

divers

- * benzomate
dioxathion + fénizon : 25 g + 50 g
* hydroxyde de tricyclohexylétain
chlorfénéthol + chlorfensulfide 37,5 g + 37,5 g

2. — MALADIES

Mildiou :

- bouillies bordelaise et bourguignonne, sulfate basique de cuivre, oxychlorure de cuivre, oxyde cuivreux : 500 g de cuivre métal
captafol : 120 g
captane : 175 g
carbatène : 300 g (raisin de table)
dichlofluamide : 125 g
folpel : 150 g
folpel : en poudrage
* mancozèbe : 280 g
manèbe : 280 g
propinèbe : 280 g
zinèbe : 250 g
association de carbatène et de cuivre, * association de dichlofluamide et de cuivre, association de folpel et de cuivre, association de mancozèbe et de cuivre, association de manèbe et de cuivre, association de métiram-zinc et de cuivre, association de propinèbe et de cuivre, association de zinèbe et de cuivre : doses homologuées pour chaque spécialité commerciale
hydroxyde de cuivre, mancozèbe, manèbe, oxychlorure de cuivre, sulfate basique de cuivre en traitements complémentaires du mildiou de la grappe en poudrage

Black-rot :

- bouillies bordelaise et bourguignonne, sulfate basique de cuivre, oxychlorure de cuivre, oxyde cuivreux : 500 g de cuivre métal
captafol : 180 g
captane : 175 g
dichlofluamide : 250 g
folpel : 175 g
mancozèbe : 280 g
manèbe : 280 g
propinèbe : 280 g
zinèbe : 250 g
association de carbatène et de cuivre, * association de dichlofluamide et de cuivre, association de folpel et de cuivre, association de mancozèbe et de cuivre, association de manèbe et de cuivre, association de propinèbe et de cuivre, association de zinèbe et de cuivre : doses homologuées pour chaque spécialité commerciale

Pourriture grise :

- * bénomyl
- * captane
- * carbendazim
- * dichlofluanide
- * folpel (pulvérisation et poudrage)
- * méthylthiophanate
- * thirame

Oïdium :

- * bénomyl
- * dichlofluanide
- dinocap : 30 g
- dinocap : en poudrage
- * méthylthiophanate
- soufres dispersés : 1 000 g de soufre pur
- soufres micronisés : 1 000 g de soufre pur
- soufres mouillables ordinaires (à ajouter à une bouillie bordelaise en raison de l'insuffisance de la tenue en suspension s'ils sont utilisés seuls) : 2 000 g de soufre pur
- soufres : en poudrage

3. — TRAITEMENT D'HIVER DE LA VIGNE

Cochenilles :

- dinoterbe : 600 g
- huiles anthracéniques, huiles jaunes, oléomalathion, oléoparathions : voir les doses homologuées pour le traitement d'hiver des arbres fruitiers

Excoriose :

- arsénite de soude : 625 g d'arsenic
- colorants nitrés : 600 g
- huiles jaunes : 1,5 l à 2 l d'huile réelle + 100 à 150 g de DNOC

Esca :

- arsénite de soude : 1 250 g d'arsenic

C. - POMME DE TERRE

Doryphore :

- | | |
|---|---------------------|
| azinhos éthyl et méthyl : 40 g | méthidathion : 30 g |
| carbaryl : 75 g | méthiocarbe : 100 g |
| carbaryl : 1 000 g | phosalone : 60 g |
| en poudrage | phosalone : 800 g |
| chlorfenvinphos : 25 g | en poudrage |
| * dioxacarb | phosmet : 50 g |
| endosulfan : 35 g | phosphamidon : 30 g |
| endosulfan : 600 g | promécarbe : 75 g |
| en poudrage | roténone : 10 g |
| lindane : 8 g | roténone : 100 g |
| lindane : 100 g | en poudrage |
| en poudrage | |
| toxaphène et polychlorocamphane : 150 g | |
| toxaphène et polychlorocamphane : 1 500 g en poudrage | |

Mildiou :

- bouillies bordelaise et bourguignonne : 500 g de cuivre métal
- captafol : 160 g
- chlorothalonil : 150 g
- folpel : 150 g
- mancozèbe : 160 g
- manèbe : 160 g
- métirame-zinc : 200 g
- oxychlorure de cuivre : 500 g de cuivre métal
- oxychlorure de cuivre : en poudrage
- oxyde cuivreux : 500 g de cuivre métal
- oxyde cuivreux : en poudrage
- propinèbe : 200 g
- sulfate basique de cuivre : 500 g de cuivre métal
- sulfate basique de cuivre : en poudrage
- zinèbe : 200 g

association de carbatène et de cuivre, * association de folpel et de cuivre, association de manèbe et de cuivre, association de propinèbe et de cuivre, association de zinèbe et de cuivre, association de ziram et de cuivre : doses homologuées pour chaque spécialité commerciale

mancozèbe, manèbe (spécialités à 6 % de matière active minimum) : 1 800 g en traitements complémentaires en poudrage

D. - COLZA

(en grammes de matière active à l'ha)

Petite altise du colza :

- endosulfan : 150 g en pulvérisation
- 200 g en poudrage
- lindane : 120 g en pulvérisation
- 160 g en poudrage
- malathion : 500 g en pulvérisation
- 700 g en poudrage
- méthidathion : 200 g en pulvérisation
- parathions : 130 g en pulvérisation
- 180 g en poudrage
- toxaphène et polychlorocamphane : 1 700 g en pulvérisation
- 2 300 g en poudrage

Grosse altise, méligèthe :

- endosulfan : 250 g en pulvérisation
- 300 g en poudrage
- lindane : 200 g en pulvérisation
- 275 g en poudrage
- malathion : 700 g en pulvérisation
- 900 g en poudrage
- méthidathion : 250 g en pulvérisation
- parathions : 200 g en pulvérisation
- 275 g en poudrage
- phosalone : 1 000 g en pulvérisation
- toxaphène et polychlorocamphane : 2 250 g en pulvérisation
- 3 000 g en poudrage

Charançon des tiges :

- endosulfan : 400 g en pulvérisation
- 500 g en poudrage
- lindane : 300 g en pulvérisation
- 400 g en poudrage
- méthidathion : 300 g en pulvérisation
- parathions : 300 g en pulvérisation
- 400 g en poudrage
- toxaphène et polychlorocamphane : 4 000 g en pulvérisation
- 5 000 g en poudrage

Charançon des siliques :

- endosulfan : 600 g en pulvérisation
- 800 g en poudrage
- lindane : 500 g en pulvérisation
- 600 g en poudrage
- méthidathion : 500 g en pulvérisation
- parathions : 500 g en pulvérisation
- 600 g en poudrage
- phosalone : 1 200 g en pulvérisation
- toxaphène et polychlorocamphane : 4 000 g en pulvérisation
- 5 000 g en poudrage

E. - BETTERAVE

(en grammes de matière active à l'ha)

Pucerons :

- * aldicarbe (traitement du sol)
- * carbofuran (traitement du sol)
- * dialifor
 - diméthoate : 500 g
 - disulfoton : 1 000 g (granulés dans la raie du semis)
 - formothion : 500 g
 - isolane : 200 g
 - lindane : 300 g
 - mévinphos : 350 g
 - oxydéméton méthyl : 200 g
- * parathion éthyl : 200 g
- * parathion méthyl : 300 g
- * phorate (traitement du sol)
- * phosphamidon : 300 g
- * vamidothion : 500 g

Mouche de la betterave :

- * acéphate
- * aldicarbe (traitement du sol)
- * azinphos éthyl et méthyl : 250 g
- * carbofuran (traitement du sol)
- * diazinon : 150 g
- * diméthoate : 250 g
- * fenthion : 500 g
- * formétanate
- * formothion : 250 g
- * lindane : 300 g
- * mévinphos : 350 g
- * parathion : 150 g
- * phorate (traitement du sol)
- * phosalone : 500 g
- * phosphamidon : 200 g
- * thiométon
- * toxaphène : 1 500 g
- * trichlorfon : 300 g

F. - MAIS

(en grammes de matière active à l'ha)

Pyrale :

- * bacillus thuringiensis
- DDT (granulés) : 1 500 g
- * fénitrothion
- * parathion
- * tétrachlorvinphos

G. - CULTURES LÉGUMIÈRES

Pucerons :

- azinphos éthyl et méthyl : 40 g
- bromophos : 50 g
- carbophénothion : 45 g
- diazinon : 25 g
- diazinon : 350 g en poudrage
- dichlorvos : 100 g
- diéthion : 75 g
- diméthoate : 30 g
- endosulfan : 60 g
- fénitrothion : 50 g
- fenthion : 75 g
- formothion : 40 g
- isolane : 6 g
- lindane : 30 g
- lindane : 400 g en poudrage
- malathion : 75 g
- malathion : 1 000 g en poudrage
- * méthidathion
- méthomyl : 30 g
- mévinphos : 35 g
- naled : 100 g
- nichlorfos : 50 g
- nicotine : 150 g
- * ométhoate
- parathion éthyl : 20 g
- parathion méthyl : 30 g
- parathion : 250 g en poudrage
- phosalone : 60 g
- pirimicarbe : 37,5 g
- prothoate : 30 g
- pyréthrines synergisées : 12 g
- roténone : 20 g

Acaricidants (1) :

esters phosphoriques de contact

- azinphos éthyl et méthyl : 40 g
- carbophénothion : 45 g
- diazinon : 25 g
- diazinon : 360 g en poudrage
- diéthion : 100 g
- malathion : 75 g
- méthidathion : 40 g
- naled : 100 g
- parathion éthyl : 25 g
- parathion méthyl : 30 g
- phenkapton : 20 g
- phosalone : 60 g
- prothoate : 30 g

esters phosphoriques systémiques

- diméthoate : 30 g
- formothion : 40 g
- mévinphos : 35 g

acaricides spécifiques

sulfones et sulfonates

- chlorbenseide : 50 g
- chlorofénizon : 50 g
- fénizon : 50 g
- * propargil
- tétradifon : 16 g
- tétrasil : 40 g

composés halogénés

- dicofol : 50 g
- dicofol : 700 g en poudrage

dérivés du benzène

- binapacryl : 50 g

quinoxaline

- chinométhionate : 12,5 g
- thioquinox : 40 g

formamidine

- chlorphénamidine : 50 g

divers

- * benzomate
- dioxathion + fénizon : 25 g + 50 g
- * hydroxyde de tricyclohexylétain

Mouche de l'asperge :

(aspergerales en voie d'établissement)

- diazinon : 30 g
- diméthoate : 50 g
- formothion : 50 g

Mouche de l'endive :

- diméthoate : 30 g
- formothion : 37,5 g

Mouche de l'oignon :

- carbophénothion (traitement du sol — granulés) : 6 000 g/ha
- chlorfenvinphos (traitement du sol — pulvérisation et granulés) : 5 000 g/ha
- diazinon (traitement du sol — granulés) : 8 000 g/ha
- diéthion (traitement du sol — granulés) : 5 000 g/ha
- diéthion (traitement des semences) : 60 g/kg
- dichlofenthion (traitement du sol — granulés) : 6 000 g/ha
- * fonofos
- trichloronate (traitement du sol — granulés et pulvérisation) : 2 500 g/ha
- trichloronate (traitement des semences) : 40 g/kg

Mouche de la carotte :

- carbophénothion (traitement du sol — granulés) : 6 000 g/ha
- chlorfenvinphos (traitement du sol — pulvérisation et granulés) : 5 000 g/ha
- diazinon (traitement du sol — granulés) : 8 000 g/ha
- diéthion (traitement du sol — granulés) : 5 000 g/ha
- dichlofenthion (traitement du sol) : 6 000 g/ha
- * fonofos (traitement du sol)
- trichloronate (traitement du sol — granulés et pulvérisation) : 2 500 g/ha

Oïdiums :

- * bénomyl
- chinométhionate : 7,5 g
- dinocap : 25 g
- dinocap : en poudrage
- * drazoxolon
- * méthylthiophanate
- * méthirimol
- soufres fluents (poudrage)
- soufre micronisé : 600 g de soufre pur (dose maximum)
- * thiophanate

(1) Les acaricides ont été divisés en groupes chimiques, pour permettre aux utilisateurs de varier leur choix, afin d'éviter d'éventuels phénomènes d'accoutumance.

N.B. — Cette note devra être soigneusement conservée, les avis s'y reporteront fréquemment au cours de l'année

Imprimerie des Stations d'Avertissements Agricoles - * N°s Paritaires 477 AD, 478 AD et 523 AD à 536 AD.

FRANLY - 14685

Directeur-Gérant : L. BOUYX